2ème Journée d'infectiologie en Aquitaine

3ème Journée des Référents en infectiologie

QCM – Coqueluche

Pré / Post Test

sanofi aventis

L'essentiel c'est la santé.

Question 1

Vous suspectez une coqueluche chez un patient qui présente une toux depuis 10 jours, vous prescrivez :

1. une recherche de Bordetella par PCR
2. une recherche de Bordetella par culture
3. une sérologie coqueluche

Vous suspectez une coqueluche chez un patient qui présente une toux depuis 10 jours, vous prescrivez :



Réponse 1

Vous suspectez une coqueluche chez un patient qui présente une toux depuis 10 jours, vous prescrivez :

1. une recherche de Bordetella par PCR

2. une recherche de Bordetella par culture

3. une sérologie coqueluche

Question 2

Vous suspectez une coqueluche chez un patient vacciné contre la coqueluche en 2000 et qui tousse depuis un mois, vous prescrivez :

1. une recherche de Bordetella par PCR
2. une recherche de Bordetella par culture
3. une sérologie coqueluche

Vous suspectez une coqueluche chez un patient vacciné contre la coqueluche en 2000 et qui tousse depuis un mois, vous prescrivez :



Réponse 2

Vous suspectez une coqueluche chez un patient vacciné contre la coqueluche en 2000 et qui tousse depuis un mois, vous prescrivez :

1. une recherche de Bordetella par PCR
2. une recherche de Bordetella par culture
3. une sérologie coqueluche

Question 3

Parmi les mesures suivantes, quelles sont celles qui sont indispensables à la prise en charge d'un nourrisson de 3 mois atteint de coqueluche à la phase des quintes ?

1. L'hospitalisation
2. L'administration du vaccin coquelucheux acellulaire
3. La prescription d'amoxicilline acide clavulanique
4. La prescription de clarithromycine
5. La prescription d'un antitussif

Parmi les mesures suivantes, quelles sont celles qui sont indispensables à la prise en charge d'un nourrisson de 3 mois atteint de coqueluche à la phase des quintes ?



Réponse 3

Parmi les mesures suivantes, quelles sont celles qui sont indispensables à la prise en charge d'un nourrisson de 3 mois atteint de coqueluche à la phase des quintes ?

1. L'hospitalisation
2. L'administration du vaccin coquelucheux acellulaire
3. La prescription d'amoxicilline acide clavulanique
4. La prescription de clarithromycine
5. La prescription d'un antitussif