

2^{ème} Journée d'infectiologie
en Aquitaine

3^{ème} Journée des Référents
en infectiologie

QCM

Recommandations I.S.T.

Pré / Post-Test

sanofi aventis

L'essentiel c'est la santé.


Question 1



Quels sont les 2 agents infectieux les plus isolés au cours des urétrites et cervicites non compliquées en France ?

1. Gonocoque + *Chlamydia trachomatis*
2. Gonocoque + *Trichomonas vaginalis*
3. *Chlamydia trachomatis* + *Mycoplasma hominis*
4. *Mycoplasma genitalium* + *Ureaplasma* sp.

Quels sont les 2 agents infectieux les plus isolés au cours des urétrites et cervicites non compliquées en France ?



Réponse 1

Quels sont les 2 agents infectieux les plus isolés au cours des urétrites et cervicites non compliquées en France ?

1. Gonocoque + *Chlamydia trachomatis*

2. Gonocoque + *Trichomonas vaginalis*

3. *Chlamydia trachomatis* + *Mycoplasma hominis*

4. *Mycoplasma genitalium* + *Ureaplasma sp.*

Question 2



Quel est le niveau de résistance aux fluoroquinolones du gonocoque en France en 2007 ?


1. 10 %

2. 20 %

3. 40 %

4. 80 %

Quel est le niveau de résistance aux fluoroquinolones du gonocoque en France en 2007 ?



Réponse 2


Quel est le niveau de résistance aux fluoroquinolones du gonocoque en France en 2007 ?

1. 10 %

2. 20 %

3. 40 %

4. 80 %




Question 3



Quels sont les antibiotiques utilisables en probabiliste sur le gonocoque ?

1. *Ceftriaxone*
2. *Azithromycine*
3. *Amoxicilline*
4. *Spectinomycine*

Quels sont les antibiotiques utilisables en probabiliste sur le gonocoque ?



Réponse3

Quels sont les antibiotiques utilisables en probabiliste sur le gonocoque ?

1. *Ceftriaxone*

2. *Azithromycine*

3. *Amoxicilline*

4. *Spectinomycine*


Question 4



Comment assurer le suivi clinique d'une urétrite ou cervicite après l'instauration d'un traitement probabiliste ?

1. *Consultation systématique à J3*
2. *Consultation à J3 si persistance des symptômes*
3. *Consultation systématique à J7*
4. *Pas de consultation de suivi*

Comment assurer le suivi clinique d'une urétrite ou cervicite après l'instauration d'un traitement probabiliste ?



Réponse 4

Comment assurer le suivi clinique d'une urétrite ou cervicite après l'instauration d'un traitement probabiliste ?

1. Consultation systématique à J3

2. Consultation à J3 si persistance des symptômes

3. Consultation systématique à J7

4. Pas de consultation de suivi