



## Révision du protocole : *pose et entretien des cathéters veineux périphériques*

JY Gassie eohh ch dax 27/11/07

---

---

---

---

---

---

---

---



## Motivations

- Parution de recommandations
  - Recommandations pour la prévention des infections liées aux KT veineux périphériques : *SFHH, HAS 2005*
  - Préparation et administration des médicaments : *CCLIN S.O 2006*
  - Critères de qualité pour évaluation et amélioration des pratiques lors de la pose et entretien des KT périphériques : *SFHH, HAS 2007*

JY Gassie eohh ch dax 27/11/07

---

---

---

---

---

---

---

---



## Identification des écarts

- EOHH:
  - Identification des écarts entre recommandations et le protocole V2
  - Décision de révision : V3
  - Mise en place d'un groupe de travail

JY Gassie eohh ch dax 27/11/07

---

---

---

---

---

---

---

---



## Groupe de travail et méthode

- Groupe de travail
  - Managé par EOHH
  - Correspondants hygiène : 10
- Méthodologie
  - Lecture des documents de référence
  - Discussion des écarts
  - Consensus sur les points d'amélioration
  - Rédaction confiée à EOHH
  - Validation par le groupe de travail puis le CLIN

JY Gassie eohh ch dax 27/11/07

---

---

---

---

---

---

---

---



## Diffusion

- Electronique sur logiciel de gestion de documents : « prismadoc »
- Présentation à l'ensemble des correspondants
- Présentation en réunion des cadres

JY Gassie eohh ch dax 27/11/07

---

---

---

---

---

---

---

---



## Les écarts identifiés à partir des recommandations SFHH 2005

- Choix du site
  - Rec. 5 : *préférer membre supérieur B1*
  - Rec. 7 : *éviter si curage radiothérapie E3*
  - Rec. 8 : *éviter si fistule artério-veineuse E3*
  - Rec. 9 : *éviter si lésions cutanées E3*
  - Rec.10 : *éviter si prothèse... D3*

JY Gassie eohh ch dax 27/11/07

---

---

---

---

---

---

---

---



## Les écarts identifiés à partir des recommandations SFHH 2005

- Hygiène des mains et port des gants
  - Rec. 14 : *gants stériles si palpation du point d'insertion après antiseptie B3*
- Antiseptie cutanée
  - Rec.18 : *chlrorhexidine alcoolique ou polyvidone alcoolique B3*

JY Gassie eohh ch dax 27/11/07

---

---

---

---

---

---

---

---



## Les écarts identifiés à partir des recommandations SFHH 2005

- Utilisation d'anesthésiques locaux
  - Rec. 27 : *détersion après application et avant antiseptie B3*
- Manipulation du KT et tubulures
  - Rec. 36 : *désinfecter embouts, robinets avec compresses stériles et alcool 70° B2*

JY Gassie eohh ch dax 27/11/07

---

---

---

---

---

---

---

---



## Les écarts identifiés à partir des recommandations SFHH 2005

- Fréquence de changement du KT
  - Rec. 49 : *maxi 96 heures (4jours) B2*
- Changement du dispositif de perfusion
  - Rec. 55 : *maxi 96 heures (4jours) B3*

JY Gassie eohh ch dax 27/11/07

---

---

---

---

---

---

---

---



**Les écarts identifiés à partir des recommandations du CCLIN :  
préparation des médicaments ....**

- Désinfecter les sites d'injection des poches
- Ne pas écrire directement sur les poches de perfusion.

JY Gassie eohh ch dax 27/11/07

---

---

---

---

---

---

---

---



**Les recommandations  
non prises en compte**

- Rec. 11 D3
- Rec. 22 B3 (base), 23, 24, 25 (pédiatrie)
- Rec. 28 B3 (base)
- Rec. 31 B3, 32 B3, 33 D2, 34 B3 (décision du groupe)
- Rec. 39 C2
- Rec. 40, 41, 42, 43 (non pratiqué dans CH)
- Rec. 50 (pédiatrie)

JY Gassie eohh ch dax 27/11/07

---

---

---

---

---

---

---

---