



MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ  
CENTRE DE CRISE SANITAIRE

Paris, le 9 DEC. 2009

Le Directeur général de la santé

à

Mesdames et messieurs les directeurs  
d'établissements de santé

Objet : Schémas vaccinaux à respecter lors de l'administration des vaccins dirigés contre le virus A(H1N1)2009.

Suite à :

- l'avis de l'European Medicines Agency - EMEA (Agence européenne du médicament) du 20/11/09 sur l'efficacité et l'innocuité des vaccins pandémiques A(H1N1)2009,
- la position de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé – Afssaps, du 23/11/09, sur le nombre de doses de vaccins pandémiques nécessaires, en l'état des données disponibles sur les vaccins autorisés et de la situation épidémiologique,
- la recommandation du Haut conseil de santé publique du 02/10/09 et du 28/10/09 sur l'utilisation des vaccins pandémiques dirigés contre le virus A(H1N1)2009,


je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint un tableau récapitulatif des schémas vaccinaux à respecter pour induire un état d'immunité contre le virus A(H1N1)2009. Ce tableau indique notamment que, pour **la population adulte et une partie de la population des enfants, selon le vaccin utilisé, la posologie peut passer à une dose sauf cas particuliers** expliqués dans le document « *Quel vaccin utiliser contre le virus A(H1N1) 2009 ?* » disponible à l'adresse suivante :

[http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/Dispositions\\_vaccinales\\_091126.pdf](http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/Dispositions_vaccinales_091126.pdf)

- vaccin Pandemrix® :
  - ne pas utiliser chez les nourrissons de moins de 6 mois,
  - le schéma vaccinal comprend 2 doses de 0.25 ml, à au moins 3 semaines d'intervalle, chez les sujets de moins de 10 ans,
  - une seule dose de 0.5 ml peut être utilisée chez les sujets de 10 ans et plus. La nécessité d'une seconde dose sera appréciée au cours des prochains mois.
- vaccin Focetria® :
  - ne pas utiliser chez les nourrissons de moins de 6 mois,
  - le schéma vaccinal comprend 2 doses de 0.5 ml, à au moins 3 semaines d'intervalle, chez les sujets de moins de 9 ans,
  - une seule dose de 0.5 ml peut être utilisée chez les sujets de 9 ans à 59 ans. La nécessité d'une seconde dose sera appréciée au cours des prochains mois,
  - le schéma vaccinal comprend 2 doses de 0.5 ml, à au moins 3 semaines d'intervalle, chez les sujets de 60 ans et plus.

- vaccin Panenza® :
  - ne pas utiliser chez les nourrissons de moins de 6 mois,
  - le schéma vaccinal comprend 2 doses de 0.25 ml, à au moins 3 semaines d'intervalle, chez les sujets de moins de 3 ans,
  - le schéma vaccinal comprend 2 doses de 0.5 ml, à au moins 3 semaines d'intervalle, chez les sujets de 3 ans à moins de 9 ans,
  - une seule dose de 0.5 ml peut être utilisée chez les sujets de 9 ans à 59 ans. La nécessité d'une seconde dose sera appréciée au cours des prochains mois,
  - le schéma vaccinal comprend 2 doses de 0.5 ml, à au moins 3 semaines d'intervalle, chez les sujets de 60 ans et plus.
  
- vaccin Celvapan® :
  - ne pas utiliser chez les nourrissons de moins de 6 mois,
  - le schéma vaccinal comprend 2 doses de 0.5 ml, à au moins 3 semaines d'intervalle, chez les sujets de plus de 6 mois.

*Le Directeur Général de la Santé,*



Pr Didier HOUSSIN