

Prise en charge d'un patient porteur d'ERV et des patients « contacts » en dialyse chronique hors de toute démarche de dépistage systématique

Fiche pratique

ARLIN Midi-Pyrénées, CCLIN Sud-Ouest - Janvier 2009

Définition de 3 groupes de patients : porteurs, contacts, naïfs

porteurs : patients avec un prélèvement positif à ERV dans les 3 derniers mois

contacts : a) patients pris en charge par la même équipe qu'un porteur
b) patients provenant d'une unité ou service concerné par ERV n'ayant pas eu 3 prélèvements de dépistage négatifs à une semaine d'intervalle

naïfs : a) patients pris en charge par une équipe distincte (autre séance de dialyse ou autre secteur géographique)
b) patients provenant d'une unité ou service non concerné par ERV

I - Organisation

En fonction du nombre de patients porteurs et de la taille du centre

Cohorting (regroupement, avec personnel dédié) des patients en 3 groupes en fonction de leur statut (porteurs, contacts « b », naïfs) :

- cohorting géographique : 3 zones distinctes avec personnel dédié
- ou cohorting temporel : 3 séances différentes avec personnel dédié ; les porteurs sont dialysés si possible en dernier de manière à garantir un bionettoyage rigoureux des locaux
- avec application des précautions standard et des précautions d'hygiène spécifiques à l'hémodialyse pour chaque groupe

Si cohorting impossible :

- dialyse des porteurs dans le(s) box d'isolement s'il(s) existe(nt)
- avec une application stricte des précautions complémentaires et un entretien rigoureux du box (toutes surfaces, objets, poignées, sangles...) et des DM réutilisables après le départ du patient
- précautions standard et précautions d'hygiène spécifiques à l'hémodialyse pour les patients pris en charge par la même équipe (contacts « a »)

L'équipe d'hygiène participe à la sensibilisation des professionnels et au suivi de la mise en oeuvre de ces mesures.

II - Dépistage et suivi

- porteurs : contrôle mensuel ; passage en secteur « contacts » après 3 contrôles négatifs
- contacts « a » : dépistage mensuel
- contacts « b » : dépistage hebdomadaire (J0, J8, J15) ; passage en secteur « naïfs » après 3 contrôles négatifs
- naïfs : rien en l'absence d'une démarche systématique décidée localement

Références

1. Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse, Société Française d'Hygiène Hospitalière, décembre 2004
2. Prise en charge d'une épidémie à ERG, CCLIN Est, décembre 2008